



ที่ ศก ๐๐๐๘/ว ๕๐๓

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยกรมปศุสัตว์ มีนโยบายที่จะทำหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงกำหนดแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ที่มีรายงานโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้แต่ละอำเภอดำเนินการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ มีพื้นที่รัศมีไม่เกิน ๕ กิโลเมตร จากบริเวณที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าทุกครั้ง ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๑ ๑๒ ๑๔ ๑๕ ๑๖ และ ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ และให้ดำเนินการตามแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ดังนี้

๑. วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมปศุสัตว์ จะต้องนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในตัวสัตว์ในระดับที่สามารถป้องกันโรคได้ โดยนำไปฉีดให้กับสัตว์รอบจุดเกิดโรค (Ring Vaccination) ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ พื้นที่รัศมี ๑ กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค ให้ดำเนินการฉีดให้กับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ สัตว์ด้อยโอกาส (สัตว์ที่อาศัยอยู่ในวัด โรงเรียน หรือพื้นที่ทางไกลหรือชนบท) สัตว์ที่สัมผัสโรคหรือสัตว์ที่มีโอกาสสัมผัสโรค(ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ)

๑.๒ พื้นที่รัศมีที่ ๑-๕ กิโลเมตร ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของและสัตว์ด้อยโอกาส

๑.๓ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข การให้วัคซีนครั้งแรกสำหรับในลูกสุนัข (อายุ < ๔ เดือน) ให้ ๑ ครั้ง เมื่ออายุ ๑๒ สัปดาห์ กรณีลูกสุนัขได้รับวัคซีนก่อน ๑๒ สัปดาห์ ควรฉีดกระตุ้นซ้ำเมื่ออายุ ๑๒ สัปดาห์ ทั้งนี้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงควรให้วัคซีนครั้งที่ ๒ ห่างจากครั้งแรก ๒-๔ สัปดาห์ ส่วนการให้วัคซีนครั้งแรกในสุนัขโตเต็มวัยให้ ๒ ครั้งห่างกัน ๒-๔ สัปดาห์ การกระตุ้นซ้ำวัคซีนให้กระตุ้นซ้ำเมื่ออายุ ๖ เดือนหรือ ๑ ปี และกระตุ้นซ้ำทุกปี

๑.๔ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแมว การให้วัคซีนครั้งแรกในลูกแมว (อายุ < ๔ เดือน) ให้ ๑ ครั้ง เมื่ออายุ ๑๒ สัปดาห์ กรณีลูกแมวได้รับวัคซีนก่อน ๑๒ สัปดาห์ควรฉีดกระตุ้นซ้ำเมื่ออายุ ๑๒ สัปดาห์ ทั้งนี้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงควรให้วัคซีนครั้งที่ ๒ ห่างจากครั้งแรก ๒-๔ สัปดาห์ ส่วนการให้วัคซีนครั้งแรกในแมวโตเต็มวัยให้ ๑ ครั้ง ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงควรให้ครั้งที่ ๒ ห่างจากครั้งแรก ๒-๔ สัปดาห์ การกระตุ้นวัคซีนให้กระตุ้นซ้ำทุกปี

๑.๕ การฉีดวัคซีนในสัตว์สัมผัสโรคหรือสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสโรคให้กักแยกสัตว์นั้น หากเป็นสัตว์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนให้พิจารณาทำลายตามกฎหมาย หากไม่สามารถทำลายได้ให้ฉีดวัคซีน ๔ ครั้งๆละ ๑ โด๊ส ห่างกันทุกๆ ๔ วัน และต้องเฝ้าระวังทางอาการอย่างเข้มงวดเป็นเวลา ๖ เดือน

๒.การฉีดวัคซีนในสัตว์ที่มีเจ้าของ ให้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของมารับการฉีดวัคซีนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ ทั้งนี้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะมีการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนเพื่อสนับสนุนวัคซีนสำหรับบริการประชาชนในพื้นที่

๓.ผู้ฉีดวัคซีนจะต้องเป็นสัตวแพทย์ ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่านั้น

๔.การฉีดวัคซีนในสัตว์ที่มีเจ้าของไม่ว่าจะเป็นวัคซีนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือวัคซีนจากกรมปศุสัตว์ (กรณีสัตว์สัมผัสโรคหรือสัตว์ที่มีโอกาสสัมผัสโรค) ผู้ฉีดจะต้องมอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้เจ้าของสัตว์ทุกราย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเมธี สุพรรณฝ่าย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ